Название спонсорской страницы о препарате

Перейти к курсу ДПО «Общие вопросы урологии» (НМО 18 ЗЕТ)

«Название препарата» (динопростон 10 мг, система вагинальная терапевтическая) - предназначен для стимуляции созревания шейки матки при доношенном сроке беременности (от 37 полных недель гестации) для использования в течение 24-часового периода.

1. Вагинальная система, содержит активное лекарственное средство динопростон в количестве 10 мг, которое распределено в полимерной гидрогелиевой матрице
2. Система обеспечивает контролируемое высвобождение препарата 0,3 мг/час в области шейки матки в течение 24 часов
3. Система содержит длинную ленту, что позволяет при необходимости немедленно извлечь вкладку
4. Систему следует извлечьчерез 24 ч независимо от степени созревания шейки матки
5. Препарат не требует размораживания перед использованием, вводится в верхнюю часть заднего свода влагалища с возможным использованием гидрогеля (смазки)
6. Окситоцин рекомендуется вводить не ранее чем через 30 минут после извлечения вкладыша
7. Препарат хранится в морозильной камере при температуре -25-10 С, не подлежит повторному замораживанию

Тут может быть Презентационный ролик

Инструкции по применению Препарата (для врача)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.12.2022 № 28902
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Цервидил, 10 мг, система вагинальная терапевтическая

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: динопростон.

Каждая система вагинальная терапевтическая содержит 10 мг динопростона.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Система вагинальная терапевтическая.

Система вагинальная терапевтическая, состоящая из тканого полиэфирного чехла в виде длинной ленты петельчатой структуры, предназначенного для извлечения системы, внутрь которого помещена одна тонкая плоская полимерная пластина прямоугольной формы с закругленными углами.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Стимуляция созревания шейки матки у беременных в возрасте от 18 лет и старше при сроке гестации ≥ 37 недель, при наличии медицинских или акушерских показаний для индукции родовой деятельности.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Препарат Цервидил следует применять только под контролем квалифицированного медицинского персонала в медицинских учреждениях, имеющих специализированные акушерские отделения с необходимым оборудованием для непрерывного мониторинга состояния плода и матки.

После введения препарата необходимо тщательно и регулярно контролировать деятельность матки и состояние плода.

<u>Режим дозирования</u>

Систему вагинальную терапевтическую (СВТ) вводят в верхнюю часть заднего свода влагалища.

Систему следует извлечь через 24 ч независимо от степени созревания шейки матки.